



Stichting **Vogelwerkgroep**
Oost-Veluwe Apeldoorn

Broedvogelinventarisatie **Ugchelsche bos - 2007**



beukenbos in vroege-ochtendlicht


kort verslag
samengesteld door
R.C.L. Versteeg

1.0 Inleiding

In de beginjaren 2000 en 2002 telden wij alleen een selectie van soorten. Vanaf 2003 werden echter alle voorkomende soorten geïnventariseerd. In 2001 werd er niet geteld in verband met MKZ.

Het gebied

Het gebied (gekleurd op de kaart) ligt aan de noordwestkant van de Otterloseweg en is globaal gesitueerd tussen 'het Leesten' en de 'Hoog-Buurlose heide'. Uit praktische overwegingen is het gebied opgedeeld in twee delen (west en oost). Het totaal bestaat uit bos, waarin verschillende bostypen voorkomen. Beide delen hebben een oppervlakte van ca. 60 ha. De totale oppervlakte van ca. 120 ha. en de daaruit volgende bezoekfrequentie van 1x per veertien dagen per deelgebied kan tot beperking hebben geleid ten aanzien van de volledigheid van de waarnemingen. (Immers, voor vergelijkbaar gemengd bosgebied is de aanbevolen oppervlakte 20-30 ha. en in een kleiner gebied kan je fijnmaziger en intensiever tellen).



de beide bosdelen west(blauw) en oost(groen)

2.0 Veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd door Vogelwerkgroep Oost-Veluwe te Apeldoorn.

Vaste telgroep: Adri van Dalen, Annelies van Hattem, Annemarie Post, Rob Versteeg

2.1 Interpretatie en verwerking

De beide deelgebieden (oost en west) werden apart om de veertien dagen op broedvogels geïventariseerd. Enkele malen werden de deelgebieden gecombineerd meer globaal geteld. Het een en ander conform onderstaand bezoekschema. Binnen de twee afzonderlijke bosdelen werd steeds volgens een vaste route gelopen, wisselend van volgorde en/of startpunt. Er werd gebruik gemaakt van de bestaande paden, behalve in de percelen 22, 24, 46 en 49. (zie kaartje op vorige pagina), waar op enkele plekken afgeweken werd van de normale paden, doch ook steeds volgens een vaste route. Perceel 50 (voormalige kapvlakte) is inmiddels dermate begroeid dat we daar in tegenstelling tot de voorafgaande jaren niet meer buiten de paden door het perceel konden lopen. Daarbij is dit perceel ook erg in trek bij de teken, die wij het liefst willen vermijden.

Gecombineerd bosdeel oost en west

| | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| 02 februari (avondtelling): | 18:30uur - 21:45uur | - Speciaal gericht op (bos)uilen. |
| 16 februari (dagtelling): | 08:00uur - 12:25uur | - Speciaal gericht op vroege soorten |
| 23 februari (avondtelling) | 19:00uur - 21:40uur | - Speciaal gericht op (bos)uilen. |
| 01 juni (avondtelling): | 22:00uur - 24:00uur | - gericht op nachttactieve vogels. |
| 20 juni (dagtelling) : | 08:15uur - 13:00uur | - gericht op soorten die wat later actief zijn. |

Bosdeel oost (aan de kant van SBB)

| | | |
|---|----------|------------------|
| 1 | 14 maart | 06:35 – 09:40uur |
| 2 | 28 maart | 07:00 – 10:20uur |
| 3 | 11 april | 06.30 - 09.30uur |
| 4 | 25 april | 06:00 – 09:15uur |
| 5 | 09 mei | 05:30 - 08:40uur |
| 6 | 23 mei | 05:10 – 08:40uur |
| 7 | 06 juni | 05:00 – 08:00uur |

Bosdeel west (aan de kant Hoog-Buurlose heide)

| | | |
|---|----------|------------------|
| 1 | 21 maart | 06:10 – 09:10uur |
| 2 | 04 april | 06:40 – 10:10uur |
| 3 | 18 april | 06.10 – 09.40uur |
| 4 | 02 mei | 05:40 – 09:15uur |
| 5 | 16 mei | 05:15 - 09:10uur |
| 6 | 30 mei | 05:00 – 08:25uur |
| 7 | 13 juni | 04:45 – 08:15uur |

De veldwaarnemingen werden op een gebiedskaart met een schaal van ca. 1 : 5000 genoteerd conform de verbeterde handleiding SOVON Broedvogel Monitor Project. (Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON, van Dijk et al 2004) en achteraf op verzamelkaarten per soort overgezet. Deze vernieuwde handleiding is door ons gehanteerd vanaf het jaar 2005. Ten opzichte van de vorige handleiding (van Dijk et al 1996) is de nieuwe handleiding vooral 'meer to the point' (tekstaanpassingen). Wel zijn er enkele (SOVON: "slechts enkele") wijzigingen aangebracht in details van de interpretatiecriteria. Hiervan mag verwacht worden dat ze ten goede komen aan de nauwkeurigheid van de interpretatie. Bij de revisie is volgens SOVON dankbaar gebruik gemaakt van op- en aanmerkingen aan het adres van SOVON door vele waarnemers, coördinatoren en collegae.

Nadat de gegevens van alle bezoekerondes op deze wijze waren verwerkt, werd conform de criteria van de handleiding het aantal territoria van de betreffende vogelsoorten vastgesteld.

Op de in dit verslag getoonde verspreidingskaarten per soort zijn de vastgestelde territoria vervolgens handmatig op een computer ingebracht d.m.v. stippen. Er is niet gericht gezocht naar nesten en de stippen zijn in de regel in het centrum van de genoteerde vogelactiviteiten geplaatst, tenzij anders vermeld. Van soorten waarvan het vermoeden bestond dat het territorium zich tot buiten het telgebied uitstrekte, zijn de stippen in de regel meer in de rand van het gebied geplaatst. Bij de rapportage wordt rekening gehouden met een indeling per zogenaamde "ecologische soortengroep".*

* ecologische soortengroepen worden behandeld in het officiële uitgebreide rapport aan onze opdrachtgever SBB.

3.0 De waarnemingen

3.1 Overzicht van alle waargenomen soorten

Onderstaand een overzicht met een vergelijking vanaf 2003, het jaar waarin we begonnen zijn met tellen van alle waargenomen soorten. Dit in tegenstelling tot de jaren 2000 t/m 2002 waar we een selectie van soorten inventariseerden. Gegeven is het totaal aantal vastgestelde territoria per soort.

| territoria soort | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | territoria soort | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| wespendief | | | 0 | | | tuinfluiter | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| havik | | 0 | | | 0 | zwartkop | 22 | 30 | 31 | 29 | 35 |
| sperwer | 0 | | | 0 | 0 | fluiter | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| buizerd | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | tjiftjaf | 15 | 26 | 12 | 12 | 17 |
| boomvalk | | 0 | | | | fitis | 13 | 19 | 17 | 20 | 16 |
| slechtvalk | | | | 0 | | goudhaan | 35 | 33 | 39 | 15 | 25 |
| houtsnip | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | vuurgoudhaan | | 1 | 2 | 2 | 9 |
| holenduif | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | grauwe vliegenvanger | 2 | | | 2 | 3 |
| houtduif | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | bonte vliegenvanger | 1 | | 3 | 1 | 2 |
| zomertortel | 1 | | | | | staartmees | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| koekoek | 1 | 1 | 1 | | | glanskop | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| bosuil | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | matkop | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| ransuil | | | | | 1 | kuifmees | 9 | 13 | 12 | 8 | 8 |
| nachtzwaluw | | | 1 | | 1 | zwarte mees | 16 | 16 | 16 | 12 | 17 |
| groene specht | | 1 | 1 | 2 | 2 | pimpelmees | 15 | 16 | 17 | 13 | 18 |
| zwarte specht | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | koolmees | 24 | 23 | 30 | 36 | 35 |
| grote bonte specht | 13 | 16 | 19 | 20 | 16 | boomklever | 11 | 8 | 15 | 9 | 15 |
| kleine bonte specht | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | boomkruiper | 23 | 28 | 24 | 27 | 29 |
| boomleeuwerik | | | 0 | | | klapekster | 0 | | 0 | | |
| boompieper | 15 | 17 | 12 | 10 | 5 | gaai | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| witte kwikstaart | 0 | | | | | zwarte kraai | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| winterkoning | 36 | 38 | 29 | 40 | 43 | raaf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| heggenmus | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | vink | 46 | 40 | 49 | 43 | 43 |
| roodborst | 25 | 31 | 35 | 37 | 37 | groenling | | 1 | | | 0 |
| zwarte roodstaart | | | | 0 | | sijs | | 1 | | | |
| gekraagde roodstaart | | | | | 3 | kruisbek | 5 | 0 | 1 | | 0 |
| beflijster | 0 | | | | | goudvink | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| merel | 12 | 13 | 22 | 21 | 21 | appelvink | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| zanglijster | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | geelgors | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| grote lijster | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | aantal territoria, totalen: | 399 | 446 | 466 | 425 | 469 |
| | | | | | | aantal soorten, totalen: | 39 | 42 | 42 | 39 | 42 |

tabel 1 blanco: niet waargenomen

0: wel waargenomen binnen de datumgrenzen, doch onvoldoende voor vaststellen territorium.



Stichting Vogelwerkgroep Oost-Veluwe - Apeldoorn